

PROLEĆNI KATALOG ZAŠTITE BILJA

2026



SOUFFLET
AGRO SERBIA

TEHNOLOGIJA ZAŠTITE STRNIH ŽITA



HERBICIDI

CROSSEFIRE

Aktivna materija:
Tifensulfuron-metil 682 g/kg
Metsulfuron-metil 68 g/kg
Formulacija: koncentrat za emulziju - EC
Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,075 kg/ha (BBCH 13-39);
Prolećni ječam 0,060 kg/ha (BBCH 13-39)

60 g/ha

BONACA® EC

Aktivna materija:
Fluroksipir 250 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju - EC
Registrovani usevi i količina:
Zimske žitarice 0,6–1,2 l/ha (BBCH 13-39);
Prolećne žitarice 0,4–0,8 l/ha (BBCH 13-39);
Kukuruz 0,8 l/ha (BBCH 13-16)

0,3 l/ha



PREDNOSTI:

- Tri komplementarne aktivne materije za širok spektar delovanja.
- Fleksibilnost u primeni (od 3 lista pa do lista zastavičara).
- 90 dana dugotrajnosti i efikasnosti na prolećne korove.
- Rešava problem čak i najtežih korova za suzbijanje kao što su Veronica sp (čestoslavica), Papaver rhoeas (bulka), Matricaria chamomilla (kamilica) i Galium (prilepača).

USLOVI PRIMENE:


- Može se primeniti od faze trećeg lista pa sve do lista zastavičara.
- Izbegavati primenu preparata ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature primene su između 5-20 stepeni Celzijusa).
- Vlažnost vazduha iznad 70%.
- Ne primenjivati u kombinaciji sa regulatorom rasta.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Veronica sp.	Myosotis arvensis	Polygonum aviculare	Solanum nigrum	Rumex crispus	Fumaria officinalis
Stellaria media	Capsella bursa-pastoris	Cirsium arvense	Sinapis arvensis	Rumex obtusifolius	Lamium purpureum
Viola arvensis	Geranium sp	Daucus carota	Raphanus raphanistrum	Senecio vulgaris	Sonchus arvensis
Papaver rhoeas	Galium aparine	Cannabis sativa	Persicaria maculosa	Sisymbrium officinale	
Matricaria chamomilla	Brassica sp.	Chenopodium album	Brassica napus	Centaurea cyanus	
Alchemilla xanthochlora	Fallopia convolvulus	Geranium sp.	Vicia sativa	Cirsium arvense	

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno

APSORPCIJA NA DVA NAČINA: PREKO LISTA I PUTEM KORENA



Fluroksipir: Usvajanje preko lista

Metsulfuron-metil: Folijarni i unos putem korena (dugotrajnost delovanja : 90 dana).

Tifensulfuron-metil: Usvajanje preko lista



HERBICIDI



REGULATORI RASTA



PAMPAS®

Aktivna materija:
Pinoksaden 50 g/l
Cloquintocet mexil 12,5 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,6-1,2 l/ha (BBCH 13-39);
Prolečni i zimski ječam 0,6-1,2 l/ha (BBCH 13-39)

1 l/ha

ALTEOX T PRIMA

Aktivna materija:
Izodecilalkoholetoksilat 900 g/l

Registrovani usevi i količina:
0,2 l/100 litara vode

0,3 l/ha na 150 lit vode

CANDOPA

Aktivna materija:
Trinexapac etil 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,3-0,5 l/ha (BBCH 25-39)

0,25 l/ha

ARSENAL

Aktivna materija:
Etefon

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39);
Ječam 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39)

0,25 l/ha

PREDNOSTI:

- Systemic herbicide with high effectiveness against grass weeds (including Lolium, wild oat).
- Flexibility in application (from leaf emergence to leaf senescence).
- Can be applied in wheat, barley and other cereals.
- Effectiveness is less dependent on climatic conditions in relation to competitive production.
- No residual effect on subsequent crops.

USLOVI PRIMENE:

- Can be applied between phase 3 leaf and leaf senescence.
- Avoid application if temperature difference between day and night exceeds 15 degrees Celsius (ideal temperature for application is between 5-20 degrees Celsius).
- Air humidity should be above 70%.
- Do not apply in combination with growth regulator.
- Immediately clean the sprayer after use with specialized means, as is the case with ProperGUARD.
- Do not apply in combination with hormonal herbicides (such as fluroxypir, 2,4-D etc.).

PREDNOSTI:

- Higher tolerance of plants to drought (improves effectiveness of weed control).
- Higher yield and quality (better assimilation of CO₂ and better tolerance to drought for lower protein content in grain).
- Lower vertical growth of plants, which leads to better root system development and better plant structure.
- Combination of CANDOPA + ARSENAL reduces the risk of phytotoxicity, while optimizing the effectiveness of growth regulators.

USLOVI PRIMENE:

- Ideal application period is from the beginning of elongation to the end of the first node and should be applied after the second node.
- Do not apply if crops are under stress conditions (drought, low or high temperature, phytotoxicity, etc.).
- Air humidity should be above 70%.
- Do not apply in combination with herbicides and especially with triazole, as it can be particularly harmful.

TRAVNI KOROV

Avena fatua	Alopecurus myosuroides
Lolium perenne	Poa annua
Poa trivialis	Bromus sp.
Agrostis stolonifera	

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno



Effectiveness of pre-emergence application of CROSSEFIRE + BONACA on Capsella bursa-pastoris and Veronica species, assessed 15 days after treatment.


Naziv proizvoda	Aktivna materija	Temperatura na dan tretmana:		Temperature u naredna 3 dana nakon tretmana:	
		Minimalna temperatura iznad °C	Srednja dnevna temperatura iznad °C	Maksimalna temperatura ispod °C	Srednja dnevna temperatura iznad °C
CANDOPA	Trinexapac Ethil 250 g/l	2	10	18	10
ARSENAL	Etephon 480 g/l	2	14	22	14



Nakon primene
CANDOPA 0,25 l/ha + ARSENAL 0,25 l/ha



Netretirana kontrola





REGULATORI RASTA

ARSENAL

Aktivna materija:
Etefon 480 g/l

Formulacija: koncentrovani rastvor - SL

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39);
Ječam 0,75-1 l/ha (BBCH 31-39)

0,4 l/ha

PREDNOSTI:

- Skraćuje gornji deo stabljike: Zrna se bolje hrane i poboljšava prinos
- Obezbeđuje bolji kvalitet zrna: Sa boljim skringingom i nižim sadržajem proteina.
- Smanjuje visinu biljke: Značajno smanjuje poleganje tokom završnih faza rasta.
- Proizvod može da se primenjuje u kombi naciji sa fungicidima

USLOVI PRIMENE:

- Idealan period primene je od pojave lista zastavičara pa do faze pojavljivanja osja.
- Ne primenjivati ako su usevi u stresnim uslovima (suša, niske ili visoke temperature, fitotoksičnost, itd.).
- Vlažnost treba da bude iznad 70%.
- Veoma je osetljiv na hidrolizu u baznom pH, zato je neophodno tretirati vodu za prskanje korektorom vode, kao što je SoftAD.

Naziv proizvoda	Aktivni materija	Temperatura na dan tretmana:		Temperature u naredna 3 dana nakon tretmana:	
		Minimalna temperatura iznad °C	Srednja dnevna temperatura iznad °C	Maksimalna temperatura ispod °C	Srednja dnevna temperatura iznad °C
ARSENAL	Etephon 480 g/l	2	14	22	14

Arsenal omogućava skraćivanje i učvršćivanje vrata stabljike koji podržava klas:



FUNGICIDI



FORAPRO®

Aktivna materija:
Protiokonazol 175 g/l
Fenpropidin 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 1 l/ha (BBCH 39-69);
Šećerna repa 1 l/ha (BBCH 39-49)

0,8-1 l/ha



PREDNOSTI:

- Visoka efikasnost na najvažnije bolesti žitarica: 2 različita načina delovanja za bolju kontrolu rezistentnosti.
- Prvi efekat boostera: Tehnologija asorbitalne® formulacije, poboljšava prodor fungicida u listove.
- Drugi booster efekat: Fenpropidin omogućava biljci da ima bolji prodor dodatne a.m. triazola u poređenju sa samim triazolom.
- Sprečavanje degradacije od sunčeve svetlosti: Formulacija pomaže u sprečavanju razgradnje aktivne materije od sunčeve svetlosti.

USLOVI PRIMENE:

- Idealan period primene je od faze prvog kolenca do faze trećeg kolenca.
- Idealna temperatura primene: 5 do 20 °C stepeni.
- Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.

FORAPRO® pruža bolju efikasnost protiv ključnih bolesti u T1

data source : ADAMA EU


PŠENICA

Pepelnica
Žuta rđa
Smeđa rđa
Septorioza
Fuzarioza
Trulež korena

JEČAM

Ječam
Rđa ječma
Helmintosporioza
Rinhosporioza
Fuzarioza
Ramularia


veoma efikasno	efikasno
srednje efikasno	neefikasno



— FORAPRO® 1 l/ha — Protiokonazol 0,7 l/ha — Fenpropidin 0,33 l/ha

Booster efekat, bolja apsorpcija kada se kombinuje fenpropidin sa triazolom

data source : ADAMA EU





FUNGICIDI

AVIATOR® XPRO

Aktivna materija:

Biksafen 75 g/l

Protiokonazol 150 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:

Pšenica 0,8-1 l/ha (BBCH 30-59);

Ječam 0,8-1 l/ha (BBCH 25-69)

0,8 l/ha

AXENTUM

Aktivna materija:

Folpet 500 g/l

Registrovani usevi i količina:

Vinova loza 1 l/ha

0.8 l/ha



PREDNOSTI:

- Širok spektar efikasnosti protiv bolesti žitarica : Visoka efikasnost čak i protiv najtežih bolesti za kontrolu, kao što su rinhosporioza, septorioza i ramularioza.
- Napredna SDHI + Triazol + Phtalamidi tehnologija Formulacija sa Biksafenom i Protiokonazolom, dve sistemne aktivne materije koje se kreću kroz biljku i štite kako već formirane listove, tako i one koji će se tek razviti.
- Xpro tehnologija daje podsticaj fiziologiji biljke. To uključuje efekat protiv starenja – biljke ostaju zelenije i zdravije duže vreme.
- Kontrola rezistentnosti: Kombinacija tri aktivne materije iz tri različite hemijske porodice (Triazol, SDHI i Phthalimidi) za odličnu kontrolu rezistentnosti.
- Folpet: Jedina aktivna materija sa kontaktim dejstvom i višemestnim mehanizmom delovanja, efikasna protiv ramularioze i septorioze, koja omogućava kontrolu čak i nad sojevima otpornim na triazole i SDHI.

USLOVI PRIMENE:

- Idealan period primene je faza lista zastavičara.
- Idealna temperatura primene : 5 do 25 stepeni.
- Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- Bez padavina u naredna 2 sata nakon primene.

PŠENICA

Pepelnica
Žuta rđa
Smeđa rđa
Septorioza
Fuzarioza
Trulež korena

JEČAM

Pepelnica
Rđa ječma
Helmintosporioza
Rinhosporioza
Fuzarioza
Ramularia


veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno



Leafshield™ podrazumeva poboljšanu tehnologiju formulacije koja dalje optimizuje pozitivna svojstva obe aktivne materije.



FORMULACIJA SA TRI ADJUVANTA



IZUZETNA POKRIVNA MOĆ



USVAJANJE U MINUTIMA - NEMA SPIRANJA KIŠOM



DUGO ZADRŽAVANJE NA LISTOVIMA



RAVNOMERNO RASPOREĐIVANJE AKTIVNIH MATERIJA




VEĆA EFIKASNOST



Levo: netretirana kontrola. Desno: ječam tretiran sa AVIATOR® XPRO u količini od 0,8 l/ha + AXENTUM u količini od 0,8 l/ha + Arsenal 0,4 l/ha.


Efikasnost Aviator XPRO: poboljšanje prinosa i očuvanje zelenih listova



Aviator® Xpro daje podsticaj fiziologiji useva. To uključuje efekat protiv starenja. Biljke ostaju zelenije i zdravije duže vreme. Ovo odlaganje senescencije značajno povećava potencijal prinosa. Ovi fiziološki efekti se takođe odnose na sposobnost useva da se oporavi nakon stresa izazvanog sušom.

Izvor: BAYER SERBIA

% efikasnosti fungicida protiv ramularioze ječma



Folpet je neizostavan proizvod u upravljanju ramulariozom ječma. Kao poslednji fungicid iz porodice ftalamida (porodica hlorotalonila), igra važnu ulogu u upravljanju sojevima septorioze pšenice koji su rezistentni na SDHI ili triazole.

Izvor: Arvalis institut za bilje.



FUNGICIDI

Asorbital®
FORMULATION TECHNOLOGY

ARMOR

Aktivna materija:
Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 1 l/ha (BBCH 31-59)

0,75 l/ha



SORATEL®

Aktivna materija:
Protiokonazol 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica i Ječam 0,6-0,8 l/ha
(BBCH 30-65)

0,5 l/ha

PREDNOSTI:

- Dva načina delovanja: kurativno i preventivno
- Veoma efikasan proizvod protiv rđe
- Stay green efekat azoksistrobina
- SORATEL®: Asorbital® formulacija za bržu apsorpciju, bolju sistemsku pokretljivost i dugotrajniju zaštitu

USLOVI PRIMENE:

- Idealan period primene je faza lista zastavičara.
- Idealna temperatura primene : 5 do 25 stepeni i vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- Bez padavina u naredna 2 sata nakon nanošenja.

ARMOR + SORATEL®

Pametna izbor za upravljanje žutom rđom

PŠENICA

Pepelnica
Žuta rđa
Smeđa rđa
Septorioza
Fuzarioza
Trulež korena

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno

JEČAM

Pepelnica
Rđa ječma
Helmintosporioza
Rinhosporioza
Fuzarioza
Ramularia



Žuta rđa

Asorbital®
FORMULATION TECHNOLOGY

JEDINSTVEN PROFIL FORMULACIJE

- Brže **usvajanje** protiokonazola
- Bolja **sistemična migracija** unutar lista
- Duža **kontrola bolesti u polju**
- Otporniji **na ispiranje** kišom
- Bezbedan za **registrovani usev**

FUNGICIDI



Asorbital®
FORMULATION TECHNOLOGY

STARPRO® 430SC

Aktivna materija:
Tebukonazol 430 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica 0,6 l/ha (BBCH 31-59),
Ječam 0,6 l/ha, Uljana repica 0,4 l/ha

0,4 l/ha



SORATEL®

Aktivna materija:
Protiokonazol 250 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Pšenica i Ječam 0,6-0,8 l/ha
(BBCH 30-65)

0,4 l/ha

PREDNOSTI:

- Moćna trijazolska kombinacija za žitarice i uljanu repicu.
- Dve aktivne materije iz grupe trijazola za snažnu kontrolu Fusarium-a, žute i smeđe rđe.
- Fleksibilna primena: T1 ili T3 tretman na žitaricama.
- SORATEL®: Asorbital® formulacija za bržu apsorpciju, bolju sistemsku pokretljivost i dugotrajniju zaštitu.
- STARPRO® 430 SC: SC formulacija za izuzetnu kompatibilnost u mešavinama.

USLOVI PRIMENE:

- Idealna faza primene je:
 - između prvog i trećeg kolenca (primena T1),
 - ili kada je 50% klasova u cvetanju (opadanje prvih prašnika za primenu T3).
- Idealna temperatura primene: od 5 do 25 °C.
- Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- Bez padavina u naredna 2 sata nakon primene.

Pametna izbor za upravljanje fuzariozama

PŠENICA


Pepelnica
Žuta rđa
Smeđa rđa
Septorioza
Fuzarioza
Trulež korena

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno


JEČAM

Pepelnica
Rđa ječma
Helmintosporioza
Rinhosporioza
Fuzarioza
Ramularia

SORATEL® protiv generičkog protiokonazola



Fuzarioza



TEHNOLOGIJA ZAŠTITE KUKURUZA






HERBICIDI

HERBICIDI



KAKO RAČUNATI LIŠĆE KUKURUZA?



3 RAZLIČITE METODE:

- Broj vidljivih listova: 7 listova.
- Ajova (IOWA) metoda: 4 lista sa ligulama ili 4 V.
- BBCH metoda: 6 listova – brojimo broj raspoređenih listova, uključujući prvi, ali ne računamo poslednji list koji još nije potpuno razvijen!

Za tretmane sa Dicambom ili Fluroksipiom, kasno je kada biljka ima više od 6 listova!

Merlin Duo Flexx i Capreno pametan izbor za suzbijanje rezistentnog Sorghum halepense!

		Terbutilazin g/ha	Isoksaflutol g/ha	Tiencarbazone metil g/ha	Tembotrion g/ha
MERLIN DUO 1.8 l/ha	Isoksaflutol 50 g/l Terbutilazin 375 g/l	675	90	0	
CAPRENO 0.3 l/ha	Tembotrion 345 g/l Tiencarbazone 68 g/l	0	0	20,4	103,5



**UKOLIKO KUPITE
3 PAKOVANJA**



**DOBIJATE JEDAN
BESPLATAN DNK
TEST ZA OTPORNOST
SORGHUM HALEPENSE
(VREDNOST 300 EURA).**

MERLIN® DUO

Aktivna materija:
Terbutilazin 375 g/l
Isoksaflutol 50 g/l
Ciprosulfamid 50 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 0,4 l/ha (BBCH 00-13 nicanja do 3. lista)

1,5-2 l/ha

PREDNOSTI:

- Fleksibilna aplikacija, može posle setve, a pre nicanja (pre EM) a može i posle nicanja pa do trećeg lista (rani post EM).
- Kombinacija 2 aktivne materije sa 2 različita načina delovanja za bolju kontrolu rezistentnih korova (uključujući sirak).
- Najbolja efikasnost je posle setve, a pre nicanja (pre EM).

USLOVI PRIMENE:

- Može se primeniti posle setve, a pre nicanja (pre EM) ili u fazi 1-3 lista.
- Izbegavati primenu ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature primene su između 7-25 stepeni Celzijusa).
- Primena je efikasnija na dobro pripremljenom zemljištu. Kao i kod svakog zemljišnog herbicida, njegova efikasnost je uslovljena vlažnim uslovima nakon tretmana.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Amaranthus retroflexus
Chenopodium album
Datura stramonium
Abutilon theophrasti
Solanum nigrum
Portulaca oleracea
Galinsoga parviflora
Ambrosia artemisiifolia
Polygonum spp.
Euphorbia spp.
Raphanus raphanistrum


Capsella bursa-pastoris
Matricaria chamomilla
Sinapis arvensis
Anagallis arvensis
Mercurialis annua
Veronica sp.
Vicia spp.
Falopia convolvulus

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli
Digitaria sanguinalis
Setaria spp.
Panicum spp.
Sorghum halepense (Efikasnost zavisi od pritiska korova)
Lolium spp.

veoma efikasno efikasno srednje efikasno

POSEBAN HERBICIDNI PROGRAM ZA KONTROLU SORGHUM HALEPENSE?





HERBICIDI



CAPRENO

Aktivna materija:

Tembotrion 345 g/l
Tienkarbazon - metil 68 g/l
Izoksadifen - etil 134 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija – SC

Registrovani usevi i količina:

Kukuruz 0,25-0,3 l/ha (BBCH 13-16
od 3. do 6. lista).

0,3 l/ha



MERO

Aktivna materija:

smeša metilestara ulja uljane
repice 733 g/l

Registrovani usevi:

Primenjuje se uz herbicide,
u količini 1-1,75l/ha.

1 l/ha

PREDNOSTI:

- **Fleksibilna primena:** Od 3. do 6. lista kukuruza.
- **Dvostruko delovanje:** Dve aktivne supstance sa različitim mehanizmima delovanja za kontrolu rezistentnih korova, uključujući Sorghum halepense.
- **Širok spektar efikasnosti:** Efikasan protiv travnih i širokolisnih korova.
- **Mogućnost mešanja:** Može se kombinovati sa herbicidima na bazi dikambe ili fluroksipira za proširenje spektra delovanja.

USLOVI PRIMENE:

- **Faza primene:** od 3. do 6. lista kukuruza.
- U cilju postizanja pune efikasnosti, preporučuje se primena u kombinaciji sa okvašivačem Mero (1 l /ha).
- Primena na zdravom kukuruza, dobro razvijenom i u dobrom vegetativnom stanju.
- **Izbegavati stresne uslove:** hladnoću, sušu, višak vode, nedostatak hranljivih materija.
- **Idealni uslovi:** bez vetra, relativna vlažnost > 60%, temperatura između 10–25°C.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Abutilon theophrasti	Chenopodiastrium hybridum	Persicaria maculosa	Fumaria officinalis
Amaranthus retroflexus	Chenopodium polyspermum	Rumex	Veronica arvensis
Ambrosia artemisiifolia	Datura stramonium	Solanum nigrum	Xanthium strumarium
Lysimachia arvensis	Lamium amplexicaule	Sonchus arvensis	Cirsium arvense
Brassica napus	Lamium purpureum	Stellaria media	Galium aparine
Capsella bursa-pastoris	Matricaria chamomilla	Veronica agrestis	Veronica hederifolia
Centaurea cyanus	Fallopia convolvulus	Viola arvensis	Mercurialis annua
Chenopodium album	Persicaria lapathifolia	Convolvulus arvensis	Veronica persica

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli	
Panicum spp	
Setaria spp.	
Digitaria sanguinalis	
Sorghum halepense	
Poa annua	
veoma efikasno	efikasno
srednje efikasno	neefikasno



Netretirana kontrola (izvor: Bayer Srbija)



CAPRENO dve nedelje nakon tretmana



HERBICIDI



MESTRONG

Aktivna materija:

Mezotrion 480 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija – SC

Registrovani usevi i količina:

Kukuruz 0,25 l/ha
(BBCH 12-18 od 2 do 8 listova)

0,15 l/ha



TERBUZIN

Aktivna materija:

Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija – SC

Registrovani usevi i količina:

Kukuruz 1,5 l/ha, Suncokret 1,5 l/ha

1,5 l/ha

PREDNOSTI:

- Fleksibilna aplikacija, može posle setve, a pre nicanja (pre EM) a može i posle nicanja pa do šestog lista (post EM).
- Kombinacija proizvoda koji se apsorbuju i kroz listove i kroz korenov sistem, sa visokom zemljišnom efikasnošću, dobro suzbijaju već prokljale korove i one koji se pojavljuju postepeno.
- Idealno, ekonomično rešenje za suzbijanje korova koje je teško kontrolisati.
- Može se kombinovati sa graminicidima za efikasnu kontrolu monokotiledonih korova.

USLOVI PRIMENE:

- Može se primeniti posle setve a pre nicanja (pre EM) a može i posle nicanja u fazi 2-6 listova (post EM).
- Izbegavati primenu ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature primene su između 7-25 stepeni Celzijusa).
- >70% vlažnosti omogućava bolju penetraciju kroz listove.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI


Amaranthus spp	Atriplex patula	Anagallis arvensis	Galium aparine
Chenopodium album	Datura stramonium	Brassica nigra	Papaver rhoeas
Mercurialis annua	Stellaria media	Matricaria spp.	Atriplex patula
Solanum nigrum	Veronica spp.	Lamium purpureum	Fumaria officinalis
Polygonum aviculare	Cirsium arvense	Senecio vulgaris	
Fallopia convolvulus	Sonchus arvensis	Sinapis arvensis	
Persicaria maculosa	Rumex acetosella	Euphorbia helioscopia	
Ambrosia artemisiifolia	Sonchus asper	Viola arvensis	

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli
Setaria spp
Digitaria sanguinalis
Poa annua
Sorghum halepense

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno

AGRO-EKONOMSKI PROGRAM





HERBICIDI

MESTRONG

Aktivna materija:
Mezotrion 480 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 0,25 l/ha
(BBCH 12-18 od 2 do 8 listova)

0,15 l/ha

FENSAR

Aktivna materija:
Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: uljna disperzija - OD

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 1-1,25 l/ha
(BBCH 12-18 od 2 do 8 listova)

1,5 l/ha

PREDNOSTI:

- Fleksibilna aplikacija, može posle setve a pre nicanja (pre EM) a može i posle nicanja sve do osmog lista (post EM).
- Kombinacija proizvoda koji se apsorbuju i kroz listove i kroz korenov sistem sa visokom efikasnošću na mono- i dikotiledone korove.
- Sinergija između 2 načina delovanja : mezotrion povećava efikasnost nikosulfurona na monokotiledone korove.
- Idealno, isplativo rešenje.
- Može se kombinovati sa dikambom za kontrolu višegodišnjih korova.

USLOVI PRIMENE:

- Fleksibilna primena: Može se primeniti od faze 2 lista do faze 8 lista (posle nicanja).
- Kombinacija proizvoda: Apsorbuju se i preko listova i preko korenovog sistema, sa visokom efikasnošću protiv mono- i dikotiledonih korova.
- Sinergija između dva mehanizma delovanja: Mezotrion povećava efikasnost nikosulfurona na monokotiledone korove.
- Idealno i isplativo rešenje.
- Mogućnost mešanja: Može se kombinovati sa terbutilazinom ili dikambom za kontrolu višegodišnjih korova.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Abutilon theophrasti	Chenopodium spp.	Galinsoga ciliata	Xanthium strumarium	Viola arvensis
Amaranthus spp.	Glebionis segetum	Geranium columbinum	Matricaria spp.	Polygonum aviculare
Ambrosia artemisiifolia	Papaver rhoeas	Geranium dissectum	Mercurialis annua	Fallopia convolvulus
Anthemis arvensis	Datura stramonium	Heliotropium europaeum	Solanum nigrum	Persicaria maculosa
Atriplex patula	Aethusa cynapium	Sonchus oleraceus	Anagallis arvensis	Senecio vulgaris
Atriplex prostrata	Euphorbia helioscopia	Sonchus asper	Stellaria media	Spergula arvensis
Bidens tripartita	Fumaria officinalis	Lamium amplexicaule	Sinapis arvensis	Veronica spp
Capsella bursa-pastoris	Galium aparine	Lamium purpureum	Brassica nigra	Vicia spp.


TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli
Setaria spp
Digitaria sanguinalis
Poa annua
Avena fatua
Sorghum halepense *

*efikasan kod jedinki koje nisu rezistentne na ALS inhibitore

veoma efikasno efikasno srednje efikasno

APSORPCIJA NA DVA NAČINA: PREKO LISTA I PUTEM KORENA




TERBUZIN
MESTRONG
FENSAR


TEHNOLOGIJA ZAŠTITE KUKURUZA DVA RAZLIČITA PROGRAMA:

AGRO-EKONOMSKI PROGRAM:

MESTRONG 0,15 l/ha sa 2 primene – FENSAR 1,5 l/ha za monokotiledone korove!



PROGRAM ZA UPRAVLJANJE OTPORNIH (REZISTENTNIH) KOROVA:



TEHNOLOGIJA ZAŠTITE SUNCOKRETA

HERBICIDI POSLE NICANJA GAJENOG USEVA



BASAR®

Aktivna materija:
S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 1-1,5 l/ha, Soja 1-1,5 l/ha, Šećerna
repa 1-1,5 l/ha Suncokret 1-1,5 l/ha

1,2 l/ha

TERBUZIN

Aktivna materija:
Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 1,5 l/ha, Suncokret 1,5 l/ha

1,2 l/ha



PREDNOSTI:

- ✓ Kompletno rešenje za borbu protiv mono kotiledonih i dikotiledonih korova.
- ✓ Prvi korak ka efikasnom suzbijanju Ambrozije i jedini način za upravljanje rezistentnišću.
- ✓ Dugotrajna efikasnost: Proizvod nudi trajnu kontrolu, pružajući poljoprivrednicima veću fleksibilnost u primeni post-herbicida.

USLOVI PRIMENE:

- ✓ Može se primeniti samo posle setve a pre nicanja u suncokretu; Posle setve a pre nicanja ili do faze 3 lista u kukuruzu.
- ✓ Efikasnost će se povećati u slučaju padavina (10-20 mm) nakon primene u periodu do 10 dana.
- ✓ Ne primenjivati na peskovitim ili propusnim zemljištima ako je najavljeno više od 20 mm kiše u roku od 3 dana nakon primene (postoji rizik od fitotoksičnosti).
- ✓ Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.


ŠIROKOLISNI KOROVI

Amaranthus spp	Persicaria maculosa
Chenopodium album	Ambrosia artemisiifolia
Mercurialis annua	Atriplex patula
Solanum nigrum	Datura stramonium
Polygonum aviculare	Stellaria media
Fallopia convolvulus	Veronica spp

TRAVNI KOROVI

Echinochloa crus-galli
Setaria spp.
Digitaria sanguinalis
Poa annua
Sorghum halepense

veoma efikasno efikasno srednje efikasno





HERBICIDI

POSLE NICANJA GAJENOG USEVA

HIPRO XTRA

Aktivna materija:
Tribenuron-metil 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule - WG
Registrovani usevi i količina:
Pšenica 25g/ha, Suncokret 30 g/ha

30 g/ha

PREDNOSTI:

- ✓ Efikasna kontrola širokolisnih korova, uključujući *Cirsium arvense* (palamidu), *Xanthium* sp. (čičak) i *Datura stramonium* (tatula).
- ✓ Fleksibilna primena od faze 2 lista do faze 8 listova.
- ✓ Split aplikacija poboljšava efikasnost na korovsku vrstu *Ambrosia artemisiifolia* (ambrozija).
- ✓ Ovo je efikasna i povoljna tehnologija za postizanje čistih useva i visokih prinosa.

USLOVI PRIMENE:

- ✓ Može se primeniti u fazi 2-8 listova
- ✓ Izbegavati primenu preparata ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature primene su između 5-15 stepeni Celzijusa).
- ✓ Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- ✓ **Ne primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi a.m. quizalofop.**
- ✓ Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je **ProperGUARD**.


ŠIROKOLISNI KOROVI

<i>Amaranthus retroflexus</i>	<i>Aethusa cynapium</i>	<i>Solanum nigrum</i>	<i>Senecio vulgaris</i>
<i>Ammi majus</i>	<i>Helminthotheca echioides</i>	<i>Stellaria media</i>	<i>Veronica hederifolia</i>
<i>Atriplex patula</i>	<i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (neefikasni na rezistentne jedinke)
<i>Bidens pilosa</i>	<i>Xanthium strumarium</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Galium aparine</i>
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Kickxia spuria</i>	<i>Fallopia convolvulus</i>	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
<i>Chenopodium album</i>	<i>Calystegia sepium</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
<i>Brassica napus</i>	<i>Matricaria chamomilla</i>	<i>Polygonum aviculare</i>	
<i>Datura stramonium</i>	<i>Mercurialis annua</i>	<i>Persicaria maculosa</i>	

TRAVNI KOROVI

<i>Digitaria sanguinalis</i>
<i>Avena fatua</i>
<i>Echinochloa crus-galli</i>
<i>Lolium</i> spp.
<i>Setaria</i> spp.
<i>Alopecurus</i> spp.

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno



HERBICIDI

POSLE NICANJA GAJENOG USEVA

IMMETAR

Aktivna materija:
Imazamoks
Formulacija: koncentrovani rastvor - SL
Registrovani usevi i količina:
Suncokret 1,0-1,25 l/ha (2-8 listova);
Soja 0,75-1 l/ha (2-4 listova);
Grašak 0,75-1 l/ha (2-4 lista)

1,25 l/ha

PREDNOSTI:

- ✓ Efikasna kontrola širokolisnih korova, uključujući *Cirsium arvense* (palamidu), *Xanthium* spp (čičak) i *Datura stramonium* (tatula).
- ✓ Fleksibilna primena od faze 2 lista do faze 8 listova.
- ✓ Split aplikacija poboljšava efikasnost na korovsku vrstu *Ambrosia artemisiifolia* (ambrozija).
- ✓ Ovo je efikasna i povoljna tehnologija za postizanje čistih useva visokih prinosa.

USLOVI PRIMENE:

- ✓ Može se primeniti u fazi od 2 do 8 lista
- ✓ Izbegavati primenu preparata ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature za primenu su između 5-15 stepeni Celzijusa).
- ✓ Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- ✓ **Ne primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi a.m. quizalofop.**
- ✓ Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je **ProperGUARD**.


ŠIROKOLISNI KOROVI

<i>Amaranthus retroflexus</i>	<i>Xanthium strumarium</i>	<i>Veronica hederifolia</i>	<i>Polygonum aviculare</i>
<i>Atriplex patula</i>	<i>Kickxia spuria</i>	<i>Ammi majus</i>	<i>Senecio vulgaris</i>
<i>Bidens pilosa</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (neefikasni na rezistentne jedinke)	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Calystegia sepium</i>	<i>Chenopodium album</i>	<i>Helminthotheca echioides</i>
<i>Brassica napus</i>	<i>Solanum nigrum</i>	<i>Sonchus oleraceus</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
<i>Datura stramonium</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Mercurialis annua</i>	<i>Matricaria chamomilla</i>
<i>Aethusa cynapium</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Stellaria media</i>	
<i>Galium aparine</i>	<i>Persicaria maculosa</i>	<i>Fallopia convolvulus</i>	

TRAVNI KOROVI

<i>Avena fatua</i>
<i>Echinochloa crus-galli</i>
<i>Setaria</i> spp.
<i>Digitaria sanguinalis</i>
<i>Lolium</i> spp.

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno





HERBICIDI

POSLE NICANJA GAJENOG USEVA

JUNIPER® MAX

Aktivna materija:
Kletodim

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC
Registrovani usevi i količina: Uljana
Repica 0,5-0,75 l/ha (BBCH 10-30);
Šećerna repa 0,75 l/ha (BBCH 10-30)

0,75 l/ha



ALTEOX T PRIMA

Aktivna materija:
Izodecilalkoholetoksilat 900 g/l
Količina:
0,2 l/100 litara vode

0,3 l/ha na 150 lit vode

PREDNOSTI:

- Najveći spektar delovanja protiv jednogodišnjih trava i samoniklih žitarica.
- Neophodan za kontrolu rezistentnih populacija korova (Avena fatua, Lolium rigidum, Digitaria spp.).
- Referenca za sve post-em herbicide protiv travnih korova koji se nalaze na tržištu, efikasan preparat za suzbijanje korovske vrste Poa annua (jednogodišnja trava).


USLOVI PRIMENE:

- JUNIPER® MAX zahteva dodavanje 0,2 l/ha ALTEOX T PRIMA.
- Količina vode: minimalno 150 l/ha.
- Temperatura: između 8°C i 25°C a korovi su u intenzivnoj fazi porasta.
- Vlažnost: najmanje 65%.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

TRAVNI KOROVI


Apera spica-venti	Lolium perenne	Poa trivialis
Bromus spp.	Volunteer cereal plants	Arrhenatherum
Digitaria sanguinalis	Setaria viridis	Festuca myuros
Avena fatua	Setaria pumila	
Echinochloa crus-galli	Agrostis stolonifera	
Panicum miliaceum	Cynodon dactylon	
Poa annua	Elymus repens	
Phalaris spp.	Holcus mollis	

veoma efikasno efikasno srednje efikasno neefikasno




sistemični proizvod koji cirkuliše u biljci da bi delovao do rizoma

TEHNOLOGIJA ZAŠTITE SUNCOKRETA



TEHNOLOGIJA ZAŠTITE SOJE





HERBICIDI

PRE NIKANJA GAJENOG USEVA

BASAR®

(primeniti u kombinaciji sa aktivnom materijom
Metobromuron 500 g/l)

Aktivna materija:
S-metolahlor

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Kukuruz 1-1,5 l/ha, Soja 1-1,5 l/ha,
Šećerna repa 1-1,5 l/ha
Suncokret 1-1,5 l/ha

1,2 l/ha

PREDNOSTI:

- ✓ Kompletno rešenje za borbu protiv monokotiledonih i nekih dikotiledonih korova.
- ✓ Primarna efikasnost na Ambrosia artemisiifolia (uglavnom u kombinaciji sa proizvodima na bazi metobromurona) i jedini način da se kontroliše rezistentnost!
- ✓ Dugotrajna efikasnost: Proizvod nudi trajnu kontrolu, pružajući poljoprivrednicima veću fleksibilnost u primeni post-herbicida.

USLOVI PRIMENE:

- ✓ Može se primeniti samo posle setve, a pre nicanja (pre-EM) u suncokretu i soji dok u kukurzu može i posle nicanja do trećeg lista.
- ✓ Efikasnost se povećava u uslovima vlažnog zemljišta.
- ✓ Efikasnost će se poboljšati i u slučaju padavina 10-20 mm u period od 10 dana nakon tretmana.
- ✓ Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI

Amaranthus spp	Senecio vulgaris
Matricaria chamomilla	Brassica napus
Veronica spp	Ambrosia artemisiifolia
Solanum nigrum	

TRAVNI KOROVI

Setaria viridis
Poa annua
Echinochloa crus-galli
Digitaria sanguinalis

veoma efikasno efikasno srednja efikasnost

HERBICIDI

PRE NIKANJA GAJENOG USEVA



IMMETAR

Aktivna materija:
Imazamoks 40 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:
Suncokret 1,0-1,25 l/ha (2-8 listova);
Soja 0,75-1 l/ha (2-4 listova);
Grašak 0,75-1 l/ha (2-4 lista)

1 l/ha

PREDNOSTI:

- ✓ Efikasna kontrola širokolisnih korova, uključujući Cirsium arvense, Xanthium spp. i Datura stramonium.
- ✓ Split aplikacija poboljšava efikasnost na Ambrosia artemisiifolia.
- ✓ Ovo je efikasna i povoljna tehnologija za postizanje čistih useva i visokih prinosa.

USLOVI PRIMENE:

- ✓ Može se primeniti između faze 3. do 5. lista.
- ✓ Izbegavati primenu ako temperaturna razlika između dana i noći prelazi 15 stepeni Celzijusa (idealne temperature nanošenja su između 5-15 stepeni Celzijusa).
- ✓ Vlažnost vazduha treba da bude iznad 70%.
- ✓ **Ne primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi a.m. kvizalofop (za uskolisne korove).**
- ✓ Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

ŠIROKOLISNI KOROVI


Amaranthus retroflexus	Xanthium strumarium	Veronica hederifolia	Polygonum aviculare
Atriplex patula	Kickxia spuria	Ammi majus	Senecio vulgaris
Bidens pilosa	Convolvulus arvensis	Ambrosia artemisiifolia (neefikasni na rezistentne jedinke)	Ambrosia artemisiifolia
Capsella bursa-pastoris	Calystegia sepium	Chenopodium album	Helminthotheca echioides
Brassica napus	Solanum nigrum	Sonchus oleraceus	Convolvulus arvensis
Datura stramonium	Sinapis arvensis	Mercurialis annua	Matricaria chamomilla
Aethusa cynapium	Raphanus raphanistrum	Stellaria media	
Galium aparine	Persicaria maculosa	Fallopia convolvulus	

veoma efikasno efikasno srednja efikasnost neefikasno

TRAVNI KOROVI

Avena fatua
Echinochloa crus-galli
Setaria spp.
Digitaria sanguinalis
Lolium spp.

Primena herbicida: poštuju fazu porasta soje.



TEHNOLOGIJA ZAŠTITE ULJANE REPICE

HERBICIDI

JUNIPER® MAX

Aktivna materija:
Kletodim 240 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:

Uljana repica 0,5-0,75 l/ha (BBCH 10-30);
Šećerna repa 0,75 l/ha (BBCH 10-30)

0,75 l/ha

ALTEOX T PRIMA

Aktivna materija:
isodecyl alcohol etoxylate 900 g/l

Registrovani usevi i količina:
0,2 l/100 litara vode

0,3 l/ha na 150 lit vode



PREDNOSTI:

- Najveći spektar delovanja protiv jedno-godišnjih travnih korova i samoniklih žitarica.
- Od suštinskog značaja za kontrolu rezistentnih populacije korova (Avena fatua, Lolium rigidum, Digitaria spp.).
- Referenca za sve herbicide na tržištu koji suzbijaju travne korove, efikasna zaštita protiv Poa annua.


USLOVI PRIMENE:

- Juniper max zahteva dodavanje 1 l/ha adjuvanta na bazi ulja.
- Količina vode: minimalno 150 l/ha.
- Temperatura: između 8 °C i 25 °C, korovi u intenzivnoj fazi rasta.
- Vlažnost: najmanje 65%.
- Odmah očistiti prskalicu nakon upotrebe specijalizovanim sredstvom, kao što je ProperGUARD.

TRAVNI KOROVI

Apera spica-venti	Lolium perenne	Poa trivialis
Bromus spp.	Volunteer cereal plants	Arrhenatherum elatius subsp. Bulbosum
Digitaria sanguinalis	Setaria viridis	Festuca myuros
Avena fatua	Setaria pumila	
Echinochloa crus-galli	Agrostis stolonifera	
Panicum miliaceum	Cynodon dactylon	
Poa annua	Elymus repens	
Phalaris spp.	Holcus mollis	

veoma efikasno efikasno srednja efikasnost neefikasno



sistemični proizvod koji cirkuliše u biljci da bi delovao do rizoma

STARPRO® 430SC
Aktivna materija:
 Tebukonazol 430 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
 Pšenica 0,6 l/ha (BBCH 31-59),
 Ječam 0,6 l/ha, Uljana repica 0,4 l/ha
0,4 l/ha



Asorbital®
 FORMULATION TECHNOLOGY
SORATEL®
Aktivna materija:
 Protiokonazol 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
 Pšenica 0,6-0,8 l/ha
 Ječam 0,6-0,8 l/ha
0,4 l/ha

ARMOR
Aktivna materija:
 Azoksitrobin 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
 Pšenica 1 l/ha (BBCH 31-59)
0,4 l/ha



STARPRO® 430SC
Aktivna materija:
 Tebuconazol 430 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Registrovani usevi i količina:
 Pšenica 0,6 l/ha (BBCH 31-59),
 Ječam 0,6 l/ha, Uljana repica 0,4 l/ha
0,4 l/ha



Asorbital®
 FORMULATION TECHNOLOGY
SORATEL®
Aktivna materija:
 Protiokonazol 250 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju - EC
Registrovani usevi i količina:
 Pšenica 0,6-0,8 l/ha
 Ječam 0,6-0,8 l/ha
0,4 l/ha

PREDNOSTI:

Visoko efikasna trijazolska kombinacija za žitarice i uljanu repicu.

- Dvostruka snaga trijazola za snažnu kontrolu Sclerotinie, Alternarije i Phome.
- SORATEL®: Absorbital® tehnologija za brzu apsorpciju, duboko prodiranje i dugotrajnu zaštitu.
- STARPRO® 430 SC: SC formulacija za izuzetnu kompatibilnost u mešavinama.
- Prednost za uljanu repicu: regulator rasta u fazi porasta stabla — poboljšava grananje, homogenizuje period cvetanja i smanjuje rizik od poleganja.

Vreme primene: u fazi obnove vegetacije, na početku izduživanja stabla (BBCH 30–32).


OPTIMALNI USLOVI:

- Blage i stabilne temperature (idealno između 8 i 20 °C).
- Izbegavati periode noćnog mraza i velikih temperaturnih oscilacija.
- Primena na dobro razvijenoj i zdravoj repici.

ULJANA REPICA

Phoma spp.		
Cilindrosporium spp.		
Sclerotinia spp.		
Alternaria spp.	veoma efikasno	efikasno
Erysiphe spp.	srednja efikasnost	neefikasno

Regulator rasta proleće primena



PREDNOSTI:

- Najbolja fungicidna zaštita i odlična efikasnost na bolestima kao što su: Phoma Lingam, Cilindrosporium, Sclerotinia Sclerotinium i Alternaria.
- Preventivno i kurativno dejstvo: štiti od postojećih infekcija i sprečava nove.
- Dugotrajna efikasnost: obezbeđuje trajnu zaštitu.
- SORATEL®: Absorbital® tehnologija za brzu apsorpciju, duboko prodiranje i dugotrajnu zaštitu.
- STARPRO® 430 SC: SC formulacija za izuzetnu kompatibilnost u mešavinama.


USLOVI PRIMENE:

- Idealna aplikacija je u fazi cvetanja (faza G1 pad prvih latica).
- Temperatura između 5 i 25 stepeni, vlažnost vazduha iznad 70%.
- Vreme: bez padavina 2 sata nakon tretmana.

ULJANA REPICA

Foma			
Cilindrosporium			
Sklerotinja			
Alternarija			
Pepelnica			
	veoma efikasno	efikasno	srednje efikasno
			neefikasno

Ogledi uljane repice fungicidi Soufflet Agriculture France 2023



KARIKA

Aktivna materija:

Acetamiprid 80 g/l
Deltamethrin 12,5 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju - EC

Registrovani usevi i količina:

Uljana repica 0,3-1 l/ha


Obaviti tretman 8 do 10 dana nakon prvog ulova insekata u zamku (početak izduženja glavnog stabla za efikasnu kontrolu štetočina).

0,5 l/ha

- Dvostruko dejstvo: sistemsko + kontaktno.
- Brz efekat + dugotrajna zaštita.
- Širok spektar delovanja: repičine pipe, sjajnik, buvači.
- Preventivno i kurativno dejstvo.
- Fleksibilna primena: pre i tokom cvetanja.



 TEHNOLOGIJA ZAŠTITE ULJANE REPICE



OBEZBEDITE USEVU SAMO NAJBOLJE

Jedinstveni asortiman proizvoda za
maksimalni prinos
i iskorišćenje potencijala svih useva

GUARDTEQ



FERTEQ



GUARDTEQ



SERVIS PROIZVOD



ProperGUARD

DETERDŽENT ZA PRANJE PRSKALICA
I POLJOPRIVREDNIH MAŠINA



ČISTA
PRSKALICA

=

GARANCIJA
IZOSTANKA
FITOTOKSIJA

Zašto je potrebno održavati prskalicu čistom?

- U cilju izbegavanja fitotoksija na gajenom bilju, glavni uzročnik su sulfoniluree (metsulfuron-metil, tribenuron-metil), pendimetalin, glifosat, hormonski herbicidi (dikamba ili 2,4 D) ili drugi herbicidi.
- Da produži vek trajanja prskalice i poljoprivredne opreme.

99,4%
Sastojci
biorazgradivi
nakon 28 dana
(OECD 301).

97,7%
Sastojci mineralnog
i biljnog porekla.



TECHNOLOGIE
TERPÈNES DE PIN


www.soufflet-agro.rs



ZAŠTO JE ProperGUARD JEDAN OD NAJBOLJIH PROIZVODA?

- Moćna formula koja kombinuje sapune i super-raspršivač adjuvant zasnovan na **tehnologiji terpentina iz bora**: obezbeđuje duboku penetraciju, čak i u mikro-poroznost prskalica i poljoprivrednih mašina,
- Efikasno uklanja ostatke, uključujući i najtvrdokornije aktivne sastojke,
- ProperGUARD **funkcioniše i sa toplom i sa hladnom vodom**,
- ProperGUARD je **efikasan bez obzira na tvrdoću vode**,
- **Bezbedan za upotrebu na metalnim površinama.**

Efikasnost različitih rastvora za čišćenje u uklanjanju ostataka:



ProperGUARD - KAKO SE KORISTI?

Samo za profesionalnu upotrebu:

Za dobar kvalitet prskanja i duži vek opreme, čišćenje se preporučuje nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI PRSKALICE:

- Napuniti rezervoar do najmanje 10% kapaciteta (prethodno ispran i ispražnjen). Dodati **1-2 litra ProperGUARD-a na 100 litara vode**.
- Pokrenuti mešanje da rastvor cirkuliše kroz cevi i ramena prskalice. Ostaviti rastvor 15 minuta, zatim isprazniti prskalicu.
- Na kraju temeljno isprati dok se proizvod potpuno ne ukloni.

ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJOSTI PRSKALICE I POLJOPRIVREDNE OPREME:

- Pripremiti rastvor od 2-5% ProperGUARD-a (0,2-0,5 l na 10 litara vode).
- Nanesite rastvor ručnom prskalicom i ostavite da deluje 15 minuta.
- Temeljno isprati mlazom ili visokopritisnim peračem.



KOLIČINA PRIMENE:

Unutrašnjost prskalice:

1-2 l na 100 l vode

Spoljašnjost prskalice i opreme:

0,2-0,5 l na 10 l vode



PROIZVOD REGISTRovan ZA:

Proizvod namenjen pranju i čišćenju spoljašnosti
mašina i unutrašnjosti prskalica, pre i posle
upotrebe.



UPOZORENJE:

Sadrži: Ciklademol, Mentanol, višekomponentni Terpinolen. Može izazvati alergijsku reakciju. Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju. Nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči. AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ako postoje i lako se uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako iritacija očiju potraje: potražiti medicinsku pomoć. Odložiti proizvod i ambalažu u skladu sa lokalnim propisima **Sigurnosni list dostupan na: www.farmi.rs**

BAČKA REGION:
Regionalni menadžer Bačka

Milan SVILAR +381 69 811 94 52

Komercijalni predstavnik prodaje Zapadna BAČKA
BŠ | Branislav ŠALAJIĆ +381 69 811 94 53

Komercijalni predstavnik prodaje Severna BAČKA
AM | Andor MAJOROŠ +381 69 811 94 57

Komercijalni predstavnik prodaje Centralna BAČKA
VK | Viktor KOVAČEV +381 69 811 94 54

Komercijalni predstavnik prodaje Južna BAČKA
DB | Dejan BANDIĆ +381 63 518 221

SREM REGION:
Regionalni menadžer Srem, Banat i Mačva

Srđan BEKRIĆ +381 69 801 50 70


Komercijalni predstavnik prodaje Zapadni SREM
GJ | Goran JOVKOVIĆ +381 69 811 94 56

Komercijalni predstavnik prodaje Istočni SREM
BB | Branislav BAČKONJA +381 62 804 78 27

BANAT REGION:
Komercijalni predstavnik prodaje Centralni BANAT
MS | Milan SAVIĆ +381 69 811 94 41

Komercijalni predstavnik prodaje Južni BANAT
JN | Jovan NIKOLIĆ +381 69 811 94 60

MAČVA REGION:
Komercijalni predstavnik prodaje Mačva
SČ | Slavica ČOBIĆ +381 69 811 94 40



SOUFFLET AGRO DOO NOVI SAD, Partizanska 64a, 21000 Novi Sad



+381 21 341 16 81



SOUFFLET
AGRO SERBIA

www.soufflet-agro.rs

